

## تمدد أو نمو شرايح الجلد

### مستشفى الأطفال التخصصي

#### معلومات للعائلات:

في هذا الكتيب شرح عن تمدد ونمو الشرايح الجلدية وماذا تتوقع عند حضور طفلك إلى المستشفى (مستشفى جريت أورموند ستريت). سوف يتأكد فريق العاملين من حصولكم على معلومات كافية كذلك التحضير لكل مراحل العلاج.

#### (1) ماذا يعني بتمدد و نمو شرايح الجلد وما هي حاجة طفلي لها ؟

تمدد أو نمو شرايح الجلد هو طريقة تسمح للجسم بنمو خلايا شرايح جلدية تساعد جراح التجميل لإعادة بناء جزء ما بالجسم . أنها تعمل على تمدد الجلد كما يحدث بتمدد الجلد على بطن السيدة الحامل. جهاز التمدد عبارة عن كيس خاص يوضع تحت الجلد ويعبأ تدريجيا بسائل خلال فترة تمتد لعدة أسابيع أو شهور. هذا الجلد الزائد يستخدم في إصلاح الحروق و التشوهات كذلك العلامات الطبيعية مثل الوحمة أو الحسنة. هذا الأسلوب مهم خصوصا لمناطق الشعر مثل الرأس حيث أن شرايح الجلد الزائد قابلة للاستمرار في نمو الشعر . الجلد الجديد يحتوي على خلايا شعرية ونهايات عصبية مهمة للحس والشعور وغالبا ما تتناسب مع لون وتكوين الجلد الحالي للمريض. هذا الأسلوب مناسب لمعظم المرضى لكنه قد لا يصلح في مناطق مصابة سابقا حيث أن الجلد يكون في حالة ضعف لا يتحمل معها تمدد الجلد.

#### (2) ما هو جهاز تمدد شرايح الجلد ؟

عبارة عن كيس مصنوع من مادة السليكون بأشكال وأحجام مختلفة. يعبأ الكيس بواسطة أنبوبة ملحقة به وكلما امتلأ الكيس بالسائل تمدد الجلد فوقه. لا يمكن للسائل أن يتسرب حيث أن هناك صمام ما بين الكيس والأنبوب. الأنبوب قد يكون تحت الجلد أو يظهر جزء منه بالخارج .

#### (3) ماذا تشمل الجراحة ؟

يقوم بإدخال كيس تمدد شرايح الجلد جراح متخصص في جراحات التجميل. أثناء العملية الجراحية يكون طفلك في حالة تخدير كامل وتأخذ من الزمن حوالي ساعة ونصف الساعة.

#### (4) هل هناك مخاطر ؟

هناك بعض المضاعفات في استعمال ممدد شرايح الجلد منها احتمال بسيط للتلوث أو النزيف بعد العملية. لذلك يحقن طفلك بمضاد حيوي خلال الجراحة لتجنب التلوث بعد الجراحة وربما يستمر في أخذ المضاد الحيوي لعدة أيام بعد الجراحة. خلال أي تخدير هناك احتمال بسيط جدا للمضاعفات كذلك احتمال بسيط لعدم إلتام الجرح بالشكل الملائم بعد العملية. يملأ الكيس تدريجيا على مراحل بنظام مقنن ومحكم ومسجل حسب إرشاد الطبيب وهناك احتمال تسرب السائل لكن يمتصها الجسم وليس هناك خطر من ذلك حيث أن السائل معقم (مكونات المياه و الملح) وفي هذه الحالة عادة يحتاج المريض لتغيير الكيس بجراحة أخرى قصيرة . المشكلة في هذه الجراحة هو منوال الوقت المستهلك وتعتمد على عمر الطفل كذلك وعيه وشعوره بوجود كيس تمدد الجلد بمكانه ولهذا الطفل في حاجة للأعداد والشرح الكافي .

#### (5) هل هناك خيار بديل ؟

البديل هو أخذ شريحة جلدية من جزء من الجسم وإستخدامها في جزء آخر . هذه الطريقة مؤلمة حيث أن مكان الجزء المنزوع و الجزء المعالج يكون ملتهب كذلك بها مخاطرة ترك علامات بالجزء المصاب والمنزوع وإحتمال فشل الجلد في النمو وهذا يعني الحاجة لجراحة أخرى . على أي حال هناك بعض الحالات لا يصلح معها إلا هذا الأسلوب من العلاج .

### (6) قبل العملية:

أنت وطفلك في حاجة لإعداد وتحضير جيد وبناء على هذا نقرر إذا كانت الإجراءات مناسبة .  
العوامل المأخوذة في الاعتبار تعتمد على عمر الطفل ومدى إستيعابه للإجراءات .  
يتكون الفريق القائم على الإجراءات من ممرضات متخصصات, متخصصة الألعاب كذلك الطبية النفسية .  
هنا سوف يعرض عليكم كيس تمدد الشرايح كذلك شرح تفاصيل كيفية العمل وعرض لصور أطفال بداخلهم كيس  
تمدد الجلد . أيضا سوف تتسلمى معلومات في رسالة الحضور عن كيفية إعداد طفلك للعملية . كذلك أنت في حاجة  
إلى الحضور للجناح الخاص بالمستشفى قبل العمية بيوم واحد لمقابلة الفريق الذى سوف يباشر طفلك . الممرضات  
سوف يأخذونك في جولة حول الجناح الخاص ويسألونك بعض الأسئلة كذلك مكان أقامتك وكيف سيباشرون طفلك  
قبل وبعد العملية . سوف يحتاج طفلك إلى تحليل للدم وتصوير منطقة الجراحة قبل العملية للتأكد أن كل شىء على  
ما يرام . كذلك سيقابلك الطبيب لشرح أبعاد العملية بالتفصيل وإذا كان لديك أى أسئلة أو قلق بعد ذلك يطلب منك  
توقيع طلب الموافقة على العملية . عليك إبلاغ الطبيب إذا كان طفلك يتعاطى أى أدوية أو يعاني من أى مشاكل  
مرضية مثل الحساسية كذلك أ صطحبى معك تلك الأدوية لعرضها على الطبيب . أيضا سوف يقابلك أخصائى  
التخدير ليشرح لك كيفية تخدير طفلك .

### (7) بعد العملية:

يعود طفلك للجناح ويظهر به أنبوب صغير خارج مكان الجراحة لتصريف أى رشح دموى ثم يزال هذا الأنبوب بعد  
يوم أو يومين بعد الجراحة كذلك يتم أ طعامه بسوا نل بطريقة ا لتتقيط داخل الشريان مباشرة وحتى يستطيع ا لطفل  
العودة للشرب بالشكل الطبيعى . يمكن للطفل أن يغادر المستشفى بعد يومين أو ثلاثة وحينما يصل منزله يجب  
الحفاظ على جفاف مكان الجراحة وحتى تتلقى نصائح من المجموعة القائمة على العلاج وذلك سيساعد على التأم  
الجراحة بشكل سليم .

### (8) العودة إلى المستشفى:

يعود طفلك إلى المستشفى خلال عشرة إلى أربعة عشر يوما بعد العملية لفحص الجراحة وإزالة غرز الخياطة  
(هناك بعض الغرز تذوب بمفردها) .  
سوف نبلغكم عن تاريخ العودة مرة أخرى قبل مغادرة المستشفى . فى حالة التأم الجرح بشكل سليم سوف يبدأ  
الفريق المعالج بملا كيس التمدد بالسائل وإذا أمكن ملا الكيس بنفس الموعد من كل أسبوع وبنفس الممرضة أو  
الطبيب . لو شعر طفلك بأى ألم خلال ملا الكيس بالسائل الرجاء إبلاغ الممرضة أو الطبيب مباشرة .  
إذا كان الأنبوب تحت الجلد سوف تطلب منك الممرضة بوضع دهان مخدر مكان الحقنة خلال ساعة على الأكثر قبل  
ميعاد المقابلة, هذا سوف يساعد على تخدير المكان فلا يشعر طفلك بأى ألم خلال إدخال الحقنة . قد يشعر طفلك  
بشء من عدم الراحة أثناء ملا كيس التمدد بالسائل لكنه لن يشعر بألم . عدم الراحة يظهر تأثيره خلال الساعات  
الأولى بعد ملا كيس التمدد بالسائل .  
إذا لم تستطع الحضور فى الموعد المحدد الرجاء الاتصال لأخطار الممرضة المسؤولة لتحديد موعد آخر يناسبكم .  
أنت في حاجة للعودة إلى المستشفى بانتظام لعدة أسابيع أو شهور للحصول على أفضل نتيجة ولهذا فأنه فى غاية  
الأهمية المواظبة و الأ يفوتك أى مقابلة دون الاتفاق على ذلك .  
عندما يمتلأ الكيس بكمية السائل الكافية وتمدد الجلد بالشكل الكافى فهناك عملية صغيرة لأزالة كيس التمدد  
وأجراء جراحة التجميل .

### (9) عندما تعود لبيتك:

عليك الاتصال بالمستشفى فى هذه الحالات:-  
\* أحمرار وسخونة مكان الجراحة .  
\* ارتفاع حرارة طفلك 37.5 أو أكثر ولا يبدو إنخفاض للحرارة بعد إعطائه (برا سيتومول) .  
\* آلام حول موضع كيس تمدد الشريحة .  
أى من الأعراض السابقة تعنى أن طفلك يعاني من التهاب وفى حاجة للعودة إلى المستشفى للفحص وإعطائه  
مضادات حيوية .  
لا تضع أى ضغوط حول أو على منطقة كيس التمدد كالضغط باليد أو وضع حزام .  
يستطيع طفلك العودة إلى المدرسة وسوف تبلغ الممرضة المدرسة وأعطائها معلومات دقيقة إذا طلب منها ذلك .

إذا تعرض طفلك لأي مضايقات من زملائه يمكن للممرضة أو الأخصائي النفسي بتوجيه إرشادات بهذا الخصوص .

### إرشادات عامة:-

- 1- نحن نوصى بالألا يشترك طفلك بدروس الألعاب الرياضية أو ممارسة الرياضة حيث أنه قد يحدث تلف لكيس التمدد.
- 2- كلما زاد امتلاء كيس التمدد كلما وجد طفلك صعوبة فى النوم بوضع معين وهنا سوف تنصحك ممرضة القسم بالوضع المناسب لراحة طفلك .
- 3- طفلك سيكون بحاجة لملايس أوسع فوق منطقة كيس تمدد شرانح الجلد .

أسم ممرضتك:

أسم طبيبك:

أسم أخصائية الألعاب:

نحن فى حاجة منك وطفلك بالتعاون معنا لآتمام هذه الأجراءات بنجاح .

رجاء التوقيع أدناه :

التوقيع:

الأسم:

التاريخ:

جدول تقدم طفلك:

التاريخ      التمدد      المجموع      الأسم      التوقيع

تحذير

حقوق الطبع محفوظة للمترجم فقط  
أى نسخ أو تقليد يقع تحت المسائلة القانونية

